PBLS pour non-professionnels

Directives de réanimation 2005 du Swiss Resuscitation Council (SRC)
d'après les recommandations de l'American Heart Association (AHA)
Réanimation de base (BLS) pour nourrissons (- 1 an)



Algorithme de réanimation PBLS nourrissons (traduit de AHA / Circulation 2005;112:IV-22) .W. Schuhwerk / L. Anselmi / A. Scherrer
08.01.2008

www.resuscitation.ch © Swiss Resuscitation Council, REA2000 2007

PBLS pour non-professionnels

Directives de réanimation 2005
du Swiss Resuscitation Council (SRC)
d'après les recommandations de l'American Heart Association (AHA)
Réanimation de base (BLS) pour nourrissons (- 1 an)

Description:

1

Veillez à votre propre sécurité!
Vériifier l'état de conscience en tapotant le pied ou l'épaule et en l'appelant a haute voix.
Etre attentif à une éventuelle réaction:
des pleurs, un soupir ou un mouvement du nourisson.

2

Si vous êtes seul:
Appeler de l'aide en criant!
Si personne ne vient, commencer 5 cycles RCP (2 min)
Si vous êtes accompagné:
Un sauveteur reste auprès du nourisson, un sauveteur appelle la centrale 144.

3

Positionner le nourisson sur le dos.
Libérer les voies respiratoires: 2 doigts sous le menton et l'autre main à plat sur le front afin de basculer légèrement la position neutre.
Observer la respiration:
Placer l'oreille sur le nez/la bouche du nourisson en regardant son torse -> écouter, regarder, sentir (min. 5 sec – max. 10 sec).

4

En cas de respiration normale (cage thoracique qui monte et descend régulièrement et visibilement): continuer d'observer le nourisson.
S'il n'y a pas de respiration normale:
2 ventilations afin que la cage thoracique monte et descend. Etre attentifs à une éventuelle réaction: des pleurs, un soupir ou un mouvement.

5

Chercher le point de compression sternale au-dessous de la ligne entre les deux mamelons. Positionner 2 doigts au-dessous de cette ligne. Presser la cage thoracique du nourisson env. 1/3 à ½ de profondeur.
Fréquence de 100/min, 5 cycles 30:2 (Un et deux sauveteurs).

6

Après 5 cycles RCP: un sauveteur contacte la centrale 144 si ce n'est pas encore fait.

6

Etre attentifs à une éventuelle réaction tous les 5 cycles: un soupir ou un mouvement du nourisson. Continuer RCP jusqu'à l'arrivée des secours professionnels ou jusqu'à ce que le nourisson bouge..

Algorithme de réanimation PBLS nourrissons (traduit de AHA / Circulation 2005;112:IV-22) .W. Schuhwerk / L. Anselmi / A. Scherrer
08.01.2008

www.resuscitation.ch © Swiss Resuscitation Council, REA2000 2007