




PBLS pour professionnels

Directives de réanimation 2005 du Swiss Resuscitation Council (SRC)
d'après les recommandations de l'American Heart Association (AHA)
Réanimation de base (BLS)
pour nourrissons (- 1 an)

A

B

C





PBLS pour professionnels

Directives de réanimation 2005
du Swiss Resuscitation Council (SRC)
d'après les recommandations de l'American Heart Association (AHA)
Réanimation de base (BLS) pour nourrissons (- 1 an)

Description:



1

Veillez à votre propre sécurité !
Vérifier l'état de conscience en tapotant le pied ou l'épaule et en l'appelant à haute voix. Être attentif à une éventuelle réaction : des pleurs, un soupir ou un mouvement du nourrisson.



2

Si vous êtes seuls :
Appeler de l'aide en criant ! Si personne ne vient, 5 cycles RCP (2 min).
Si vous êtes accompagné:
Un sauveteur reste auprès du nourrisson, un sauveteur appelle la centrale 144.



3

Positionner le nourrisson sur le dos.
Libérer les voies respiratoires : 2 doigts sous le menton et l'autre main à plat sur le front afin de basculer légèrement la tête en arrière. Si nécessaire poser une serviette pliée sous les épaules.
Observer la respiration :
Placer l'oreille sur le nez/la bouche du nourrisson en regardant son torse -> écouter, regarder, sentir (min. 5 sec – max. 10 sec) :



4

En cas de respiration normale (cage thoracique qui monte et descend régulièrement et visiblement) :
continuer d'observer le nourrisson.
S'il n'y a pas de respiration normale: 2 ventilations, afin que la cage thoracique monte et descende (plusieurs essais si nécessaire).



5

Contrôle du pouls fémoral ou brachial (min. 5 – max. 10 sec)
5a. Si le pouls existe: toutes les 3 sec une ventilation.
Toutes les 2 min contrôle du pouls.



6

Un Sauveteur contacte la centrale 144 si ce n'est pas encore fait.



7

5 cycles RCP: un sauveteur 30:2, deux sauveteurs 15:2
Contrôle du pouls tous les 5 cycles.
Continuer RCP jusqu'à l'arrivée des secours professionnels ou jusqu'à ce que le nourrisson bouge.