




PBLS für Professionals

Reanimations - Richtlinien 2005 Swiss Resuscitation Council (SRC)
nach Guidelines American Heart Association (AHA)
Basic Life Support (BLS) bei Säuglingen
(bis 1 Jahr)





PBLS für Professionals

Reanimations - Richtlinien 2005 Swiss Resuscitation Council (SRC) nach Guidelines American Heart Association (AHA) Basic Life Support (BLS) Säuglingen (bis 1 Jahr)

Beschreibung:



1

Beachten Sie die eigene Sicherheit!
Überprüfen des Bewusstseins durch Klopfen gegen den Fuss oder an der Schulter und lautes Ansprechen.
Achten auf eine Reaktion wie weint, stöhnt oder bewegt sich der Säugling.



2

Sind Sie alleine:
Um Hilfe rufen (schreien)! Kommt niemand zur Hilfe, 5 Zyklen BLS (2 Min.)
Sind Sie zu zweit oder mehrere Helfer: Erster Helfer bleibt beim Säugling.
Zweiter Helfer setzt den Notruf 144 ab.



3

Säugling in Rückenlage bringen. Atemweg öffnen: 2 Finger an das Kinn und die andere Hand flach auf die Stirn legen und so den Kopf leicht nach hinten überstrecken. Bei Bedarf ein gefaltetes Tuch unter Schulter legen.
Atmung beurteilen:
Mit dem Ohr über die Nase/Mund des Säuglings mit Blickrichtung auf die Brust -> Hören, Sehen, Fühlen (min. 5 - max. 10 Sek.).



4

Wenn normale Atmung (deutliches und regelmässiges Heben und Senken des Brustkorbes) vorhanden: Säugling weiter beobachten.
Wenn keine Atmung vorhanden: 2 x beatmen, so dass sich der Brustkorb hebt und senkt. (mehrere Versuche erlaubt)



5

Pulskontrolle an der Brachialarterie (min. 5 - max. 10 Sek.).
5.a Wenn Puls vorhanden: alle 3 Sek. eine Beatmung abgeben.
Alle 2 Min. Puls überprüfen.



6

Ziehen Sie eine Linie zwischen den Brustwarzen, legen Sie 2 Finger unterhalb dieser Linie auf das Brustbein. Drücken Sie das Brustbein des Säuglings um etwa 1/3 bis 1/2 der Gesamttiefe des Brustkorbes nach unten.
Frequenz ist 100/Min 30 : 2.
Zwei Helfer 15 : 2. (Kompression durch Hände um den Thorax.)



7

Ein Helfer, sofern noch nicht bereits geschehen, Alarmierung Tel.144.

8

5 Zyklen Ein Helfer 30 : 2 , Zwei Helfer 15 : 2
Überprüfe Puls alle 5 Zyklen. Mit BLS weiterfahren bis das Notfallteam übernimmt oder der Säugling sich bewegt.